


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1 és 5 literes kanna címkéje



Belsőleges oldat

1 liter

~~5 liter~~

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Coophavet (23 rue du Prieuré, Saint Herblon 44150 Ancenis, Franciaország)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártók:

Merial (4 Chemin du Calquet, 31057 Toulouse, Franciaország)

Coophavet (Saint Herblon 44150 Ancenis, Franciaország)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Amprol 12 % oldat A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

100 ml oldat tartalmaz:

Hatóanyag: Amprólium-hidroklorid 12 g
(megfelel 10,6 g Ampróliumnak)

4. JAVALLAT(OK)

Baromfifajok Eimeriák okozta kokcidiózisának gyógykezelésére és megelőzésére.

Házityúkban (brojlercsirke, tenyészttyúk, előnevelt jérce, tojótyúk): *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. praecox*. Mérsékelt hatás tapasztalható néhány *Eimeria* fajjal szemben: *Eimeria maxima*, *E. brunetti*, *E. mitis*.

Pulykában: *Eimeria adenoides*, *E. gallopavonis*, *E. meleagriditis*.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem ismeretesek.

6. MELLÉKHATÁSOK

Az Amprol 12 % oldat széles biztonsági sávval rendelkezik, amennyiben az ajánlott adagolásban használjuk. A gazdaállatban ritkán tiamin hiánytünetek léphetnek fel, amelyek tiamin adagolással megszüntethetők. Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Házityúk (brojlercsirke, tenyészttyúk, előnevelt jérce és tojótyúk), pulyka.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Használat előtt jól felrázandó. Ivóvízbe keverve alkalmazandó.

Az amprólium-hidroklorid maximális adagja a madarak korától függően: házityúk: 25-73 mg/ttkg/nap, pulyka: 14-60 mg/ttkg/nap.

Adagolás csirkékben és pulykákban:

Kezelés módja	Adag/ttkg (amprólium)	Adag (Amprol 12%)	Adag (amprólium)	Kezelés időtartama
Első kezelés (mérsékelt fertőzés)	10 mg/ttkg/nap	50 ml 50 liter vízben oldva	120 ppm	5-7 nap
Első kezelés (súlyos fertőzés)	20 mg/ttkg/nap	50 ml 25 liter vízben oldva	240 ppm	5-7 nap
Fenntartó kezelés (az első kezelést követően a újrafertőzés megelőzése céljából)	5 mg/ttkg/nap	50 ml 100 liter vízben oldva	60 ppm	1-2 hét
Megelőzés	5 mg/ttkg/nap	50 ml 100 liter vízben oldva	60 ppm	A kockázatos időszakban

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Alkalmazása közben enni, inni és dohányozni tilos! Használat után kezét kell mosni! Ha a készítmény a bőrre vagy a szembe kerül, alapos vizes öblítés szükséges!

Nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel.

A kokcidiózis elleni sikeres védekezés az irányító személyzettől és telepenként az eltérő környezeti feltételektől függ. A hőmérséklet változása, a páratartalom, az alom állapota, a jelen lévő kokcidiumok faja és ezek gyógyszerekkel szembeni ellenálló képessége, a takarmányozási program, egyéb interkurrens betegségek megjelenése, valamint az állattartó hozzáállása mind olyan tényezők, melyek befolyásolják a kokcidiosztatikumok hatékonyságát. Így elmondható, hogy a jó vezetési gyakorlat a megfelelő módon alkalmazott Amprol 12 % odattal kiegészítve megoldást jelenthet a kokcidiózis problémájára.

Néhány kokcidium törzs nem érzékeny az ampróliumra. Ahol ilyen törzsek előfordulnak, olyan kokcidiumellenes szer használata javasolt, mellyel szemben ezek a törzsek érzékenyek. A kokcidiózis elleni programok elkezdése előtt baromfi kóronctani és parazitológiai konzultáció szükséges.

10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Házityúk és pulyka ehető szövetek: 0 nap

Tojás: 0 nap

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK


Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

Csak a címkén feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A tartály első felbontása után felhasználható: 3 hónapig.

Az előírás szerinti hígítás után felhasználható: 24 óra.



12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Nincs.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2013. május 6.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Vényköteles.

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Kiszerezési egységek:

1 liter és 5 liter csavaros biztonsági tetővel lezárt műanyag kannában.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez: Rhone Vet Kft. 2053 Herceghalom, Petőfi u. 9.

Tksz:

2841/1/10 MgSzH ÁTI (1 l)

2841/2/10 MgSzH ÁTI (5 l)

Exp.: {hónap/év}

Lot: {szám}