

**A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁS EGYBEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
125 ml-es, **500 ml-es, 1 literes** flakon

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Cofacoli oldat A.U.V.

**2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

Kolisztin-szulfát 200 millió NE/100 ml

**3. GYÓGYSZERFORMA**

Belsőleges oldat

**4. KISZERELÉSI EGYSÉGEK**

125 ml

**500 ml**

1 liter

**5. CÉLÁLLAT FAJOK**

Szarvasmarha (borjú), sertés (malac), házityúk (brojler csirke, tojó tyúk).

**6. JAVALLAT(OK)**

Kolisztinre érzékeny nem invazív *E. coli* által okozott gasztrointesztinális fertőzések kezelésére.

**7. ELLENJAVALLAT(OK)**

Nem alkalmazható a készítmény valamely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.  
Kifejlett bendőflórájú állatnak nem adható.

**8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

Szájon át adandó be.

Borjú és sertés esetében az ajánlott dózis naponta 100 000 NE kolisztnin testtömegkilogrammonként 3-5 egymást követő napon át. Az ajánlott dózist két adagra kell felosztani, amennyiben a terméket közvetlenül az állat szájába adják be.

Házityúk (brojlercsirke és tojótyúk) esetében az ajánlott dózis naponta 75 000 NE kolisztnin testtömegkilogrammonként 3-5 egymást követő napon át.

**9. ÉLELMÉZÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Élelmezés egészségügyi várakozási idő:

Hús és egyéb ehető szövetek: Borjú, sertés, brojler csirke, tojó tyúk: 1 nap.

Tojás: nulla nap.

**10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

25°C alatt az eredeti csomagolásban tárolandó.


**11. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**

**A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések**

A kezelt állomány testtömege és napi ivóvízfogyasztása alapján kell meghatározni az ivóvízbe bekeverendő gyógyszer mennyiségét. A gyógyszeres ivóvizet naponta frissen kell készíteni.

Az előírt adagot és a terápiá időtartamát indokolatlanul nem szabad túllépni.

Kiterjedt bélfalkárosodás esetén megnő a felszívódó kolisztnin mennyisége. A keringésbe kerülő kolisztnin nephro- és neurotoxikus hatású.



**12. A FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK**

**Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések**

Polimixin iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést.

A készítmény kezelésekor és adagolásakor védőkesztyű használata javasolt.

A készítmény kezelésekor tilos enni, inni és dohányozni. Használat után kezét kell mosni.

Véletlen szembe kerülés esetén bő vízzel ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény címkéjét.

**13. VEMHESÉG, LAKTÁCIÓ VAGY TOJÁSRAKÁS IDEJÉN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁS**

Tojó tyúkoknak a készítmény adható.

**14. LEJÁRATI IDŐ**

Exp.:

**15. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

**16. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, amennyiben alkalmazható**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra - kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

**17. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK**

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

**18. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME**

Coophavet, 23 rue du Prieuré, Saint Herblon, 44150 Ancenis, Franciaország

**19. TÖRZSKÖNYVI SZÁM**

882/1999. FVM

**20. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

Lot:

Használati utasítás utolsó jóváhagyásának dátuma:

2013. május 7.

