

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eurican DHPPi2-L vakcina

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, NEVE ÉS CÍME, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország

Felszabadítás helye:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation 69800 Saint Priest

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Eurican DHPPi2-L vakcina

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Liofilizált komponens:

attenuált kutya szopornyica vírus	min. $10^{4,0}$ TCID ₅₀ *
attenuált kutya adenovírus 2-es típus	min. $10^{2,5}$ TCID ₅₀
attenuált kutya parainfluenza-2 vírus	min. $10^{4,7}$ TCID ₅₀
attenuált kutya parvovírus	min. $10^{4,9}$ TCID ₅₀
vivóanyag, q.s.	1 adag

*TCID₅₀= Szövettenyészetben 50%-os sejtkárosító hatást kifejtő mennyiségű vírus.

Folyékony komponens:

inaktivált <i>Leptospira canicola</i>	akkora mennyiségben, hogy az Európai
inaktivált <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i>	Gyógyszerkönyv szerint védelmet adjon
vivóanyag, q.s.	1 ml

4. JAVALLAT(OK)

Egészséges kutyák aktív immunizálására szopornyica-, adeno-, parainfluenza- és parvovírus okozta megbetegedések, valamint leptospirozis ellen.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem ismeretesek.

6. MELLÉKHATÁSOK

A vakcina nagyon ritkán túlérzékenységi reakciót válthat ki, mint például (de nem kizárólagosan) allergiás ödéma, hányás, letargia, viszketés és alacsony vérnyomás. Ezekben az esetekben tüneti kezelést kell alkalmazni.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

8. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

1 ml vakcinát bőr alá kell oltani a következő program szerint:

9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Alapimmunizálás:

Első oltás: 7 hetes kortól

Második oltás: 3-5 héttel később

Emlékeztető oltás:

Évenkénti oltása ajánlott; ha az állat leptospirozis szempontjából veszélyeztetett környezetbe kerül, félévente javasolt vakcinázni.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK


2°C - 8°C közötti hőmérsékleten szállítandó és tárolandó. Fénytől és fagyástól óvni kell. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Lejáratási idő: 24 hónap. A feloldott készítményt azonnal fel kell használni.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Csak teljesen egészséges állatok vakcinázhatók, melyeket legalább 10 nappal az oltást megelőzően féregtelenítettek. Az immunitás teljes kialakulásáig tartózkodjunk az állatok komolyabb fizikai terhelésétől. Tartsuk be az aszepszis szabályait. Csak steril, fertőtlenítő anyagoktól mentes eszközöket használjunk.

Vemhesség és szoptatás alatt vakcinázott szűkákön nem észleltek nemkívánatos hatásokat.



A készítmény más vakcinákkal történő egyidejű alkalmazásáról nincsenek hatékonysági és ártalmatlansági adatok ezért az oltás előtt és után egyéb vakcinák alkalmazását az eset megítélésétől függően szükséges eldönteni.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati terméket főzéssel, elégetéssel vagy a hatóságok által engedélyezett fertőtlenítőszerbe merítéssel kell ártalmatlanítani.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2014. április 4.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

15.1. Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

15.2. Forgalmazhatóság

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

15.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

10, 50 vagy 100 adag. Minden adag vakcina 1 ml folyékony részből és 1 adag liofilizált részből áll.

15.4. Törzskönyvi szám

2942/1/11 MgSzH ÁTI (1 adag)

